

Specialtandplejen

Patientinformation • Regional Specialtandpleje • Hospitalsenhed Midt

Indikationer for CBCT-undersøgelse henvist til RSP

1. Retinerede og overtallige tænder

- Når disse på panorama overlejrer andre strukturer/nabotænder

2. Retinerede og semiretinerede visdomstænder

- Når tanden på panorama har en større rumopfyldende proces (fx cyste)
- Når der på panorama er mistanke om resorption af 2. molar, hvis dette har betydning for behandlingsvalg
- Når der er høj sandsynlighed for, at amotio ændres til dekonering efter CBCT-data

3. Intern resorption/ekstern resorption

- Når der på 2D optagelser er mistanke om resorption, der kan involvere pulpa, men det ikke kan afgøres om denne er intern eller ekstern

4. Før indsættelse af tandimplantat

- Når man ikke på 2D optagelser ikke kan vurdere knoglebredde/højde
- Hvis der vurderes behov for knogleopbygning

5. Rumopfyldende processer i kæben, fx cyster/tumorer

- Når vurderingen af processens udbredelse har betydning for valg af behandling

6. Patient med symptomer/smerter fra tænder eller kæber

- Når 2D optagelser ikke kan udrede patientens smertebillede

7. Kæbeled

- Når den kliniske undersøgelse ikke har haft den ønskede effekt, og der er høj sandsynlighed for, at CBCT vil ændre behandlingsvalget
- Ved sygdomme/tilstande der afficerer kæbeledet (fx arthritis, ankylose)
- Ved mistanke om fraktur