

Lokal smertelindring til sår

Præperat	Indholdsstof	Dispenseringsform og styrke	Pakning	Virkning	Applicering	Bemærkninger
Emla/ Tapin	Lidocain Prilocain	1 g creme indeholder 25mg lidocain + 25 mg prilocain	30 g 5 g + 2 plastre 5 x 5 g + 12 plastre	Lokalanalgetikum af amidtypen til overfladeanalgesi før procedurer	1 time på intakt hud min. 45 min i sår	<i>Creme</i> appliceres i et tykt lag i sårbunden. Dækkes med film. Virkningstid: ½ - 2 timer
Xylocain	Lidocain	Gel 2 % Kutanspray 100mg/dosis Salve 5 %	10 sprøjter á 10 g 30 g 50 ml 35 g	Lokalanalgetikum af amidtypen til overfladeanalgesi før procedurer	1 - 3 min. I sår	Lidocain virker mere overfaldisk i vævet ift Emla og Tapin. Kutanspray indeholder alkohol Virkningstid: 10-15 min.
Biatian Ibu	Ibuprofen (polyurethan skumbandage)	0,5 mg/cm ibuprofen	Bandagestørrelse: 5 x 7 cm 10 x 10 cm 10 x 20 cm 15 x 15 cm 20 x 20 cm	Ibuprofen frigives kontinuerligt, når sårsekret kommer i kontakt med bandagen Bruges som smertelindring	Må kombineres med physiotulle, ellers direkte kontakt til sårbund	Effekt vurderes i løbet af 24 timer
Morfingel	Morfin	Gel 0,3 % Gel 0,6 %	Tube a 100ml	Lokal analgetikum Bruges som smertelindring	Indenfor 10-60 min Ved forb.sk evt X 2 i døgnet	Magistrelt præparat I Virkningstid: 10-12 t eller længere
Versatis	Lidocain	1 plaster indeholder 700mg lidocain svt. 50 mg pr. gram klæbelag	30 stk plastre 10x14 cm	Lokal analgetikum Bruges som smertelindring	Påsættes intakt hud proksimalt for sår	Påsættes x 1 dgl, må højest sidde i 12 timer, herefter pause 12 timer Må til klippes